

Paroxetina

Aquest full t'ajudarà a entendre millor per què el teu metge o metgessa t'ha receptat la Paroxetina.

Per a què serveix la Paroxetina?



La Paroxetina és un medicament antidepressiu. Això vol dir que es fa servir quan sentim massa tristesa o tenim depressió. També es fa servir quan tenim ansietat o un trastorn obsessivocompulsiu.



La Paroxetina t'ajudarà si sents tristesa, si estàs nerviós o nerviosa, si no estàs tranquil o tranquil·la, o també si t'enfades sovint.

Com he de prendre la Paroxetina?



El teu metge o metgessa t'explicarà com prendre la Paroxetina.



Has de saber en quins moments del dia l'has de prendre, si has de fer-ho abans o després d'un àpat, durant quants dies o setmanes, i si pots trencar la pastilla o desfer-la en aigua perquè sigui més fàcil d'empassar.

Has de continuar prenent la Paroxetina tot i que passats uns dies et sentis millor. No deixis de prendre la Paroxetina fins que t'ho digui el teu metge o metgessa.

Què passa si m'oblido de prendre la Paroxetina?

Si t'oblides de prendre la Paroxetina, avisa algú de confiança i comenta-l'hi. Pren la següent pastilla a l'hora que et toca prendre-la. Mai prenguis la pastilla de Paroxetina que et toca juntament amb la que t'has oblidat, és a dir, no en prenguis dues de cop.

Quins són els efectes secundaris de la Paroxetina?

Quan prenem un medicament, es produeixen efectes en el nostre cos.

Els efectes que no buscàvem que apareixen quan prenem un medicament s'anomenen efectes secundaris.

No tothom nota efectes secundaris quan pren un medicament.

La majoria d'efectes secundaris no són greus i desapareixen al cap d'uns dies. Alguns d'aquests efectes secundaris no passen gairebé mai.

Alguns efectes secundaris de la Paroxetina són:



Tenir diarrea.



Tenir estrenyiment.



No tenir ganes de menjar.



Tenir la boca seca.



Sentir-se nerviós o nerviosa.



Tenir la sensació de no poder estar quiet o quieta.



Sentir-se marejat o marejada.



Tenir mals de cap.



Tenir tremolors.



Tenir menys ganes de mantenir relacions sexuals.



Tenir problemes per dormir.



Tenir molta son.



Suar molt.

Si notes algun efecte secundari, consulta un professional de la salut, com per exemple:




El teu metge o metgessa.



El personal d'infermeria.



Un farmacèutic o farmacèutica.



Truca al 061.

Informació important




Si prens Paroxetina, no beguis alcohol.



Informa el teu metge o metgessa si estàs prenent altres medicaments, plantes medicinals, complements alimentaris o si estàs embarassada.



Si tens dubtes sobre la Paroxetina, pots consultar el teu metge o metgessa, el teu farmacèutic o farmacèutica o trucar al 061.



En cas d'emergència, truca al 112.

La informació d'aquest prospecte en lectura fàcil no substitueix la informació del prospecte original sobre:

- El nom del principi actiu.
- La identificació del medicament i el seu titular.
- Les instruccions per a la seva administració, ús i conservació.
- Els seus efectes adversos, interaccions i contraindicacions.

Aquesta informació s'ha de donar al pacient d'acord amb l'article 15 del RDL 1/2015, de 24 de juliol, que és la llei que regula com s'han d'utilitzar els medicaments i els productes sanitaris.

Edita:

dincat

Subvenciona:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'IRPF

Col·laboren:

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA

Col·legi de Metges de Barcelona

IAS Institut d'Assistència Sanitària

CONSORCI SANITARI DEL MARESME